



Adenium magvetés/Útmutató az adenium magok vetéséhez

Az adenium magok csíráztatása és a magok vetése nem nehéz feladat, az adeniumok könnyen termeszthető növények.

A magokból kelt kis magoncok nem hasonlítanak az anyanövény virágszínére, a magvetésből 99%-ban rózsaszín virágú magoncokat kapunk. A virágok általában szimpla szíromkörösek, ritkán előfordulhat a dupla, tripla szíromkörös magonc is. A magról nevelt adenium növények virágzására kb.1-2 évet is várni kell, de a saját termesztésű növény és az újonnan kapott, esetenként egyedülálló hibrid kárpótol a várakozásért.



Az optimális időszak a magvetésre tavasztól kezdődik, mikor az átlaghőmérséklet és a nappalok hosszabbodnak, a napsütéses órák száma már emelkedik. A kis magoncoknak a megfelelő fejlődéshez szükségük van a világos és napos helyre, a melegebb hőmérsékletre.

Előkészületek:

A magokat áztasd nedves papírtörülőbe 1-3 napig, ne hagyd, hogy a papírtörülő száraz legyen. Ha szükséges nedvesítsd újra.

Alkalmas lehet a magokat egy műanyag tároló dobozba helyezni, de vigyázni kell, hogy a magok ne fülledjenek be, időnként szellőztess meg őket.

Előfordul, hogy a friss magok már a papírtörülőben csírázásnak indulnak, ekkor már vethetőek is.

A magvetés:

Az adenium magokat egy arra alkalmas vetőtálcába ültethetjük, a földkeverék legyen 50% kókuszrost és 50% perlit. Nedvesítsd meg a közeget, majd öntözd meg megfelelő arányban hígított gombaölő szerrel. (ez a palántadőlés és a penész elkerülése miatt szükséges)



A magokat egyenlő távolságra helyezd a közegbe úgy, hogy azok vízszintesen fekszenek a közeg tetején.

Enyhén takard a vetőközeggel, nem kell mélyre vetni őket.



A magokkal vetett tálcát helyezd világos, lehetőség szerint napos, meleg helyre. A tálca tetejét lehet takarni is, ekkor figyelni kell a folyamatos szellőztetésre, hogy a magok ne fülledjenek, rohadjanak el a közegben. A közeget tartsd mindig nedvesen, ne hagyd kiszáradni.

Átlagos csírázási idő 1-4 hét, ez függhet a magok frissességétől.

A magoncok pikírozása, cserépbe ültetése:

Amikor kikeltek a kis adenium magoncok, akkor először a két szikleveél jelenik meg a növényen. A mag héját nem szükséges eltávolítani, azt a növény feljődése során magától elveszíti, ledobja. Mikor az első levélpár megjelenik, akkor már lehet cserepezni a kis adenium magoncot. Az ültető közegbe ekkor már kerülhet egy kevés általános virágföld és kavics, vagy homok is.



A cserép mérete kb. 7-cm legyen, nem szükséges nagy cserépbe helyezni őket, az adenium inkább szorosan üljön a cserépben. A kis magoncok megfelelő fejlődéséhez elengedhetetlen az erős gyökérzet, melyet az erre aktuálisan forgalomba lévő műtrágyák segítségével is táplálhatunk.

Tavaszi végén, nyári elején az adenium magoncokat fokozatosan lehet már szoktatni a napsütéshez, vigyázni kell, hogy hirtelen ne kerüljenek a napra, leveleik ne égjenek meg.

Két öntözés között a földjüket hagyd egy kicsit kiszáradni, kerülni kell a sok vizet! A már megerősödött magoncokat általános műtrágyával (pl., Volldünger Linz, Wuxal) nevelhetjük tovább.

Remélem, hogy hasznos tanácsaim hozzásegítenek a sikeres magvetéshez és a plumeria magonc neveléséhez!

Sok sikert és örömteli magvetést kívánok! ☺

Web: <https://egzoticplant.hu/>

Fb: <https://www.facebook.com/egzoticplant>

Tel: +3620/386-2361

Email: info@egzoticplant.hu

